

南東北グループ 医療法人財団 健貢会

# 総合東京病院通信

2021.7

Vol. 105

●編集・発行／総合東京病院

医療連携支援センター 地域連携室 TEL:03-3387-5444

## 特集

後発白内障レーザー治療、  
緑内障、網膜光凝固について



眼科  
内海 卓也

## 診療案内

白内障手術、緑内障手術・点眼治療・レーザー治療、後発白内障レーザー治療、糖尿病網膜症レーザー治療、網膜裂孔レーザー治療、硝子体注射等の眼科診療を行っております。

## 緑内障に関して


慢性的な緑内障は様々な原因によって起こりますので、対応やケアもそれぞれ異なります。原因、病期に応じ必要な治療を行います。緑内障の初期には自覚症状がほとんど無く、視力低下や視野の異常などの自覚症状が現れた時にはかなり進行した状態のことが多

いので、早期発見が大切です。視野の異常といっても、視野が狭くなる感覚とは限らず、霞むような感覚のこともあります。

血縁者に緑内障の人がいたり、眼圧が高いと言われている方、糖尿病がある方は緑内障にかかる率が高くなるので注意が必要です。

40歳以上の20人に1人が緑内障にかかっているといわれています。特に日本人では正常眼圧緑内障という眼圧が高くないタイプの緑内障が多いので、眼圧が正常

## ○後発白内障手術 (YAGレーザー)



後発白内障

YAGレーザー治療後

人工眼内レンズの裏の濁りをレーザー治療で改善できます

## 寄附金のお願い

～新型コロナウイルスから患者さんを守るために～

寄附金は、病院の施設や環境の整備、新しい知識や技術などの研究開発、医療スタッフ育成のための経費に活用させていただきます。皆さまからのご協力・ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

詳細はこちら

### お問合せ

総合東京病院 寄附受付係

TEL : 0570-00-3387 メールアドレス [tokyo-hp.kifu@mt.strins.or.jp](mailto:tokyo-hp.kifu@mt.strins.or.jp)



## 特集 後発白内障レーザー治療、緑内障、網膜光凝固について

範囲だからといって安心はできません。検診で視神経乳頭陥凹拡大、神経繊維束欠損、高眼圧などの緑内障の疑いを指摘された方は特に注意が必要です。定期的に眼科を受診するようにしてください。


眼の検診を受ける機会のない40歳以上の方は、眼科で定期的に検査を受けるようにしてください。



### 急性緑内障発作に関して

急性緑内障発作は眼圧が急上昇することにより短時間で失明に至る救急疾患です。眼痛、頭痛、吐き気、視力低下、充血を伴うことが多いです。個人差により、もともとの眼の性質で急性緑内障発作を起こしやすい方もいますが、白内障の進行に伴い危険性が高まる方もいます。発症予防のためのレーザー治療や白内障手術が行われます。

### ○網膜光凝固術(眼底レーザー治療)



網膜裂孔(左)や糖尿病網膜症(右)に対するレーザー治療  
レーザーで網膜を焼き固める(白い点の部分)  
ことにより、病気の進行を抑えます

### 患者さんへのメッセージ

白内障や緑内障、レーザー治療が必要な眼の疾患は治療のタイミングが大切です。気になってはいるけれど、なかなか眼科を受診する機会のない方、前回の受診から期間が空いている方、白内障手術を受けてからしばらくして霞んで見えてきた方は、この機会に眼科受診を検討ください。

見えづらい?と思ったら…  
**眼科をご受診ください**



外来日：月～土（土は午前のみ）  
ご予約：0570-00-3387  
（予約・相談ダイヤル）